11.04.2022 Консультация: (индивидуальная) «Как влияет короткая подъязычная связка языка на речь?».

Одной из причин нарушений звукопроизношения или отсутствия речи — может быть *короткая подъязычная уздечка*. При таком варианте язык мало подвижен, как правило, мышечный тонус повышен (спастичен) и движения ограничены.

На что не влияет длина подъязычной связки:.

- На формирование коммуникативной функции.
- На задержку речевого развития.
- На формирование грамматического строя речи.

Важно знать!

- Длина подъязычной связки влияет на формирование правильного фонетического уклада звуков верхнего подъема: Р, Рь, Ш, Ж, Ч.
- Длина подъязычной связки влияет на формирование прикуса.
- Длина подъязычной связки влияет на объем и полноценность движения языка в ротовой полости (сосание, жевание, глотание).

Основные признаки қоротқой подъязычной связки:

- Кончик языка прикреплен ко дну ротовой полости: это значительно ограничивает его подвижность.
- Подъязычная связка укорочена в передней части, часто представляет собой прозрачную тонкую пленку, лишенную сосудов. По мере взросления пленка становится плотнее, в ней формируются кровеносные сосуды.
- Язык складывается в форме желобка или "сердечка", при этом появляется характерный щелкающий звук.

Современная хирургия предлагает выполнить пластику подъязычной связки с помощью лазера:

- Это бескровная процедура длительностью не более 10 минут.
- В процессе манипуляции сосуды слизистой спаиваются и не нуждаются в наложении шва.
- Лазер обладает бактерицидным эффектом.
- Восстановительный период очень короткий.
- Под языком не образуются рубцы.
- Ребенок забудет о процедуре уже на следующий день.

Есть такие патологии подъязычной связки, при которых требуется более серьёзное хирургическое вмешательство с наложением швов (метод коррекции подъязычной связки выбирает хирург).

Современная логопедия в большинстве случаев предлагает подъязычную связку тянуть.

Так резать или тянуть? После очного осмотра определяю маршрут действий и обсуждаю с родителями возможные варианты:

- 1. Тянуть подъязычную связку с помощью специальных логопедических артикуляционных упражнений и массажных приёмов. Этот процесс может занять от 1 месяца и дольше.
- 2. Подготовить артикуляционный аппарат к хирургическому вмешательству.
- 3. Направить к хирургу для проведения пластики подъязычной связки.
- 4. Через 7-10 дней продолжить логопедическую работу по коррекции речи.

Уздечка языка: 3 степени аномалии



Учитель-логопед: Дмитриева Л. В.